

# ENTEROGRAN



## 1. Thành phần

Thành phần: Trong **EnteroGran gói 1g** có chứa thành phần chính là:

Bào tử kháng đa kháng sinh Bacillus clausii: 2 x 10<sup>9</sup>CFU.

Tá dược vừa đủ 1 gói.

Dạng bào chế: Thuốc bột uống.

## 2. Tác dụng - Chỉ định của EnteroGran (Bột)

### Dược lực học

Bacillus clausii tồn tại trong sinh phẩm ở trạng thái bào tử, nhờ vậy khi uống vào dạ dày nó không bị axit cũng như các enzym tiêu hóa ở dịch vị phá hủy cũng như sống sót dưới sự tấn công của muối mật trong ruột non. Nhờ những đặc tính này, các bào tử này dễ dàng đến ruột non để phát triển thành dạng sinh dưỡng, giúp tái lập cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

Bacillus clausii có khả năng tổng hợp một số vitamin, đặc biệt vitamin nhóm B, góp phần bổ xung vitamin thiếu hụt do việc dùng thuốc kháng sinh hoặc hóa trị. Sự có mặt của các lợi khuẩn giúp tăng cường chức năng của hệ miễn dịch đường tiêu hóa thông qua tăng hiệu suất quá trình bài tiết yếu tố A immunoglobulin.

Bacillus clausii có khả năng phát triển và hoạt động ngay khi có mặt các kháng sinh như penicillins, cephalosporins, tetracyclines, macrolides, aminoglycosides, novobiocin, Chloramphenicol, Lincomycin, Rifampicin, nalidixic acid ...

### Dược động học

Bacillus calusii xuất hiện trong phân và đạt đến nồng độ tối đa sau chỉ một ngày điều trị. Nồng độ Bacillus clausii đã đạt được duy trì gần như không đổi trong suốt thời gian điều trị, sau đó giảm xuống theo cấp lũy thừa trong thời gian theo dõi (50% của nồng độ tối đa vào ngày thứ 3-4, trở về nồng độ lúc ban đầu nghiên cứu vào khoảng ngày thứ 10).

### **Chỉ định dùng EnteroGran**

Điều trị và phòng ngừa rối loạn vi sinh đường ruột và bệnh lý kém hấp thu vitamin nội sinh.

Điều trị hỗ trợ để phục hồi hệ vi sinh đường ruột bị ảnh hưởng do dùng thuốc kháng sinh hoặc hóa trị.

Rối loạn tiêu hóa cấp và mạn tính.

## **3. Liều dùng - Cách dùng EnteroGran**

### **Liều dùng EnteroGran**

**EnteroGran liều dùng** do nhà sản xuất khuyến cáo như sau:

Trẻ em: 1-2 gói / ngày. Uống trước bữa ăn 30 phút.

Trẻ em bị tiêu chảy, phân lỏng: 3 gói / ngày. Cách 3-4 giờ dùng 1 gói.

Người lớn: 3-4 gói / ngày

### **Cách sử dụng EnteroGran**

Cần pha thuốc với nước sôi để nguội rồi uống.

### **Cách pha thuốc EnteroGran:**

Không được uống chung thuốc với đồ uống có ga hay chứa chất kích thích. Không pha thêm chất tạo ngọt hay đường vào để uống thuốc vì nó dễ làm ảnh hưởng đến hoạt tính của thuốc.

EnteroGran pha bao nhiêu nước? Tỷ lệ thuốc và nước pha như thế nào cần phải đọc kỹ hướng dẫn in trên bao bì sản phẩm hoặc tờ hướng dẫn sử dụng đi kèm

Sử dụng trước bữa ăn hàng ngày 30 phút.

## **4. Chống chỉ định**

Quá mẫn với thành phần trong sản phẩm.

## **5. Tác dụng phụ**

Nghiên cứu trên lâm sàng chưa chỉ ra tác dụng phụ khi dùng EnteroGran (Bột).

Tuy nhiên hãy theo dõi cơ thể, tình trạng sức khỏe để phát hiện những dấu hiệu bất thường sớm nhất. Khi gặp bất kỳ biểu hiện do tác dụng phụ nào hãy báo cho bác sĩ ngay để nhận được hướng giải quyết.

## **6. Tương tác**

Chưa ghi nhận thông báo về tương tác khi dùng EnteroGran (Bột) cùng dược phẩm khác. Báo cho bác sĩ nếu muốn dùng trên 2 loại dược phẩm để tránh tương tác có hại xảy ra.

## **7. Lưu ý khi sử dụng và bảo quản**

### **Lưu ý và thận trọng**

Gói bột sau khi mở nên được sử dụng ngay để tránh không khí tràn vào gây vón cục và ảnh hưởng đến chất lượng.

Thuốc bột đã pha với nước nên dùng ngay. Nếu uống 1 liều chưa hết thì phần còn lại để vào tủ lạnh rồi uống tiếp nhưng không được để quá 24 giờ sau khi hòa nước.

Tuân thủ theo liều dùng được quy định trên tờ hướng dẫn sử dụng và theo chỉ dẫn của bác sĩ, dược sĩ.

Thận trọng khi dùng trong thời gian điều trị với thuốc kháng sinh, nên uống EnteroGran xen kẽ giữa các liều dùng kháng sinh.

### **Lưu ý sử dụng trên phụ nữ mang thai và bà mẹ cho con bú**

EnteroGran an toàn và có thể dùng cho phụ nữ mang thai và bà mẹ cho con bú.

### **Xử trí khi quá liều**

Các báo cáo chưa tiếp nhận trường hợp nào quá liều đối với EnteroGran. Nếu xảy ra tình trạng trên, hãy đưa nạn nhân đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.

### **Bảo quản**

Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

## **8. Tài liệu tham khảo**

Dược thư quốc gia Việt Nam

Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

# Enterogran

BÀO TỬ VI KHUẨN KHÁNG ỨA KHÁNG SINH **BACILLUS CLAUSII**

## THÀNH PHẦN:

- Trong 1 gói 1 g chứa:
- *Bacillus clausii*:  $2 \times 10^9$  CFU
- Tá dược (Lactose, Glucose, Hương sữa)... vừa đủ 1 g.

## DẠNG BÀO CHẾ - QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

- Thuốc bột
- Hộp 10 gói x 1g
- Hộp 20 gói x 1g

## DƯỢC LỰC HỌC:

- ▶ *Bacillus clausii* tồn tại trong sinh phẩm ở trạng thái bào tử, nhờ vậy khi uống vào dạ dày nó không bị axit cũng như các enzym tiêu hóa ở dịch vị phá hủy. Bào tử *Bacillus clausii* cũng có thể sống sót dưới sự tấn công của muối mật trong ruột non. Nhờ những đặc tính này, *Bacillus clausii* dễ dàng đến ruột non để phát triển thành dạng sinh dưỡng, giúp tái lập cân bằng hệ vi sinh đường ruột.
- ▶ *Bacillus clausii* có khả năng tổng hợp một số vitamin, đặc biệt vitamin nhóm B, góp phần bổ sung vitamin thiếu hụt do việc dùng thuốc kháng sinh hoặc hóa trị.
- ▶ *Bacillus clausii* kích thích chức năng của hệ miễn dịch đường tiêu hóa bằng cách tăng sản xuất của tiết A immunoglobulin - gián tiếp hoạt động như một chất đối kháng với vi khuẩn gây bệnh lây nhiễm qua đường tiêu hóa.
- ▶ *Bacillus clausii* có khả năng phát triển và hoạt động ngay khi có mặt các kháng sinh như penicillins, cephalosporins, tetracyclines, macrolides, aminoglycosides, novobiocin, chloramphenicol, lincomycin, rifampicin, nalidixic acid...

## DƯỢC ĐỘNG HỌC:

*Bacillus clausii* xuất hiện trong phân và đạt đến nồng độ tối đa sau chỉ 1 ngày điều trị. Nồng độ *Bacillus clausii* đã đạt được duy trì gần như không đổi trong suốt thời gian điều trị, sau đó giảm xuống theo cấp lũy thừa trong thời gian theo dõi (50% của nồng độ tối đa vào ngày thứ 3-4, trở về nồng độ lúc ban đầu nghiên cứu vào khoảng ngày thứ 10).

## CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị và phòng ngừa rối loạn vi sinh đường ruột và bệnh lý kém hấp thu vitamin nội sinh.
- Điều trị hỗ trợ để phục hồi hệ vi sinh đường ruột bị ảnh hưởng khi dùng thuốc kháng sinh hoặc hóa trị.
- Rối loạn tiêu hóa cấp và mạn tính.

## LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Mỗi lần uống 1 gói
- Trẻ em: 1-2 gói/ngày. Uống trước bữa ăn 30 phút.
- Trẻ em bị tiêu chảy, phân sống: 3 gói/ngày.
- Cách 3-4 giờ dùng 1 gói.
- Người lớn: 3-4 gói/ngày.

## CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Mẫn cảm với thành phần của thuốc.

## THẬN TRỌNG:

- Thận trọng khi dùng trong thời gian điều trị với thuốc kháng sinh, nên uống Enterogran xen kẽ giữa các liều dùng kháng sinh.

**GÓI**  
**1g**

- Phụ nữ có thai và cho con bú: không ảnh hưởng.
- Đối với khả năng lái xe và vận hành máy móc: không ảnh hưởng.

## TƯƠNG TÁC THUỐC:

- Không có tương tác thuốc khi dùng chung với các thuốc khác.
- Để ngăn ngừa tương tác thuốc có thể có với một vài loại thuốc, hãy thông báo cho Bác sĩ hoặc Dược sĩ biết nếu đang sử dụng bất kỳ thuốc gì.

## TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

- Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

## QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

- Chưa có báo cáo về việc sử dụng quá liều.
- Nếu dùng quá liều thuốc khuyến cáo, bỏ qua liều tiếp theo, sau đó tiếp tục liều trình như thông thường.

## ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN:

Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

## HẠN DÙNG:

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.  
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.



Sản xuất bởi:

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG**

Văn phòng: 26 Hàn Thuyên, TP. Nha Trang, Khánh Hòa.  
Nhà máy: Suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa



**BEPHARCO**

Phân phối bởi: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE.**

Văn phòng: 436B/76, đường 3 tháng 2, P.12, Q.10, TP. HCM.

Tel: (+8428)36220205 / Fax: (+8428)38632115

Email: [bepharco.vietnam@bepharco.com](mailto:bepharco.vietnam@bepharco.com)

Website: [www.bepharco.com](http://www.bepharco.com)

