

NORMAGUT

Men *Saccharomyces boulardii* đông khô 250 mg

THÀNH PHẦN:

Mỗi viên nang cứng chứa:

Hoạt chất: Men *Saccharomyces Boulardii* đông khô 250 mg chứa ít nhất $2,5 \times 10^9$ tế bào.

Tà dược: Lactose, Magnesi stearat, Gelatin, Titan dioxyd (E171), sắt oxyd hydrat (E172) (oxyd sắt vàng), phức hợp Chloropyllin-đồng (E141).

ĐƯỢC LỢI HỌC:

Men *Saccharomyces boulardii* là men vi sinh (probiotic) không gây bệnh, có tác dụng cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tăng cường hoạt động của men tiêu hóa, phục hồi khả năng lắng hấp thu của niêm mạc ruột, tăng cường hệ miễn dịch, bất hoạt nội độc tố và ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh.

ĐƯỢC ĐỘNG HỌC:

Saccharomyces boulardii đạt nồng độ tương đối ổn định trong ruột trong vòng 3 ngày sau khi uống và nhanh chóng thải trừ khỏi ruột trong vòng 2-5 ngày sau khi ngừng điều trị.

CHỈ ĐỊNH:

Thiết lập và duy trì hoạt động hiệu quả của đường ruột, cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột.

Phòng và điều trị tiêu chảy liên quan để chế độ dinh dưỡng đường ruột.

Phòng và điều trị tiêu chảy do *Clostridium difficile* hay do tiêu chảy dùng kháng sinh.

Ngăn ngừa tiêu chảy do đi du lịch.

Hỗ trợ điều trị trong phác đồ diệt trừ *H. Pylori*.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

Người lớn và trẻ em lớn hơn 12 tuổi:

- Thiết lập và duy trì hoạt động hiệu quả của đường ruột và cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột: mỗi lần 1 viên, uống 1-2 lần/ngày.

- Điều trị tiêu chảy: 1 viên một lần, uống 1-2 lần/ngày.

- Ngăn ngừa tiêu chảy do đi du lịch: mỗi lần 1 viên, uống 1-2 lần/ngày, bắt đầu từ 5 ngày trước khi đi du lịch.

- Hỗ trợ điều trị trong phác đồ diệt trừ *H. Pylori*: mỗi lần 1 viên, 1-2 lần/ngày hoặc theo chỉ định của bác sĩ.

Trẻ em từ 2 đến 12 tuổi:

- Mỗi lần 1 viên, 1-2 lần/ngày.

Trẻ em dưới 2 tuổi: theo sự hướng dẫn của Bác sĩ.

Cách dùng: Tháo nắp viên nang, cho thuốc trong nang vào bình sữa, ly nước hoặc nước trái cây rồi cho trẻ uống, không nên trộn thuốc vào các dung dịch quá nóng (trên 50°C) hoặc quá lạnh (nước đá) vì thuốc có chứa các tế bào men nấm sống, không được pha với cồn.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Bệnh nhân mẫn cảm với nấm men hay bất cứ thành phần nào của thuốc.

Bệnh nhân suy giảm miễn dịch như HIV, cấy ghép cơ quan, xạ trị.

THẬN TRỌNG:

Nếu sau 2 ngày điều trị mà vẫn bị tiêu chảy, nên tham khảo ý kiến của bác sĩ.

Không nên trộn thuốc vào các dung dịch quá nóng (trên 50°C) hoặc quá lạnh (nước đá) vì thuốc có chứa các tế bào men nấm sống, không được pha với cồn.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Có thể gặp triệu chứng đầy hơi.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Có thể dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú khi có sự theo dõi của bác sĩ.

ẢNH HƯỞNG TRÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Chưa có dữ liệu nghiên cứu.

TƯƠNG TÁC THUỐC KHÁC:

Dùng chung với thuốc kháng nấm có thể làm giảm tác dụng của *Saccharomyces boulardii*.

Dùng chung với chất ức chế monoamino-oxidase có thể gây tăng huyết áp.

QUÁ LIỀU

Nếu dùng quá liều, tác dụng phụ có thể nặng hơn. Trong trường hợp này nên tham khảo ý kiến bác sĩ.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: Dưới 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng trực tiếp.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 3 vỉ x 10 viên.

TIÊU CHUẨN: Nhà sản xuất.

Lưu ý:

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

- Không dùng thuốc quá hạn sử dụng ghi trên hộp.

- Không dùng thuốc khi có bất kỳ dấu hiệu thay đổi nào trên viên thuốc.

- Để thuốc tránh xa tầm tay trẻ em.

Sản xuất bởi:

ARDEYPHARM GMBH

Loerfeldstr.20 58313 Herdecke-Deutschland, Đức.

NORMAGUT
(*Saccharomyces boulardii*)

COMPOSITIONS:

Each capsule contains :

Active ingredient: Lyophilized *Saccharomyces Boulardii* 221.25 mg and Lactose Monohydrate 28.75 mg

Excipients: Anhydrous Lactose, Magnesium stearate, Gelatin, Titanium dioxide (E171), Iron oxide hydrate (E172) (yellow iron oxide), Chlorophyllin-copper complex (E141).

INDICATIONS

For establishment and maintenance of a well-functioning intestinal flora and a good intestinal health.

Treatment and prevention of *Clostridium difficile* diarrhea and antibiotic associated diarrhea.

DOSAGE AND ADMINISTRATIONS

Children over 12 years and adults:

For establishment and maintenance of a well-functioning intestinal flora and a good intestinal health or treatment of diarrhea: 1 capsule once or twice daily.

For prevention of traveller's diarrhea: 1 capsule once or twice daily starting 5 days before departure.

Children 2-12 years old:

Take 1 capsule once or twice daily by taking off the capsule shell and putting the content of a capsule into a feeding bottle or a glass of water or a glass of juice.

Children below 2 years: should consult a doctor.

CONTRAINDICATIONS:

It should not be used with known hypersensitivity to yeast or any component of capsule.

Immunocompromised patients such as HIV infections, organ transplantation and radiotherapy.

SPECIAL WARNING & PRECAUTIONS:

Should consult physician, if diarrhea lasts longer than 2 days.

ADVERSE EFFECT

May often cause flatulence

Inform your physician of any adverse effects while using this drug

USING FOR PREGNANCY AND LACTATION

During pregnancy, this product should be used only when clearly needed. Discuss the risks and benefits with your doctor.

It is unknown whether this product passes into breast milk. When breast-feeding, Consult your doctor before using.

EFFECTS ON ABILITY TO DRIVE AND OPERATE MACHINE

No data available.

INTERACTIONS

Taking with antimycotic drugs may impair the effect of *Saccharomyces boulardii* and taking with monoamino-oxidase inhibitors may increase the blood pressure.

OVERDOSE

If you have considerably overdosed Normagut, side effects may occur to an increased extent. In this case, you should consult a doctor.

STORAGE: Below 30°C, in dry place, protect from direct sunlight.

SHELF LIFE : 24 month from manufactured date.

PACKING STYLES: Box of 3 blister x 10 tablets.

SPECIFICATION: In-House

RECOMMENDED:

- Keep all medicines out of the reach of children.
- Do not use this product if it is out of date.
- Do not use this product if there are any significant change in appearance of capsule.
- Read carefully the leaflet before use.

Manufactured by:

ARDEYPHARM GMBH

Loerfeldstr.20 58313 Herdecke-Deutschland Germany

I-N304-M64-00-04

8411021