

Simeticone Normon 40 mg chewable tablets

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc trước khi dùng

1. THÀNH PHẦN CÔNG THỨC THUỐC.

Thành phần hoạt chất: Simeticone40 mg.

Thành phần tá dược: Compressible sugar, Sorbitol, Saccharin sodium, Magnesium aluminometasilicate, Strawberry flavour.....vừa đủ 1 viên.

2. DẠNG BÀO CHẾ.

Viên nén nhai.

Mô tả: Viên nén nhai tròn, hai mặt lõm, màu trắng

3. CHỈ ĐỊNH.

- Chống đầy hơi, làm giảm triệu chứng khó chịu do có quá nhiều khí trong đường tiêu hóa như căng đường tiêu hóa trên, cảm giác nặng, đầy bụng, khó tiêu, giảm đau do đầy hơi sau mổ.
- Dùng trước khi nội soi dạ dày và trước khi chụp X quang để làm mất các bóng khí, tăng khả năng nhìn rõ.

4. CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG.

Cách dùng: Simeticone Normon 40 mg chewable tablets được nhai kỹ trước khi nuốt. Dùng sau mỗi bữa ăn và trước khi đi ngủ.

Liều dùng:

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: 40 – 125 mg/ lần, 4 lần/ ngày. Liều tối đa không vượt quá 500 mg/ ngày. Liều cao hơn (250 mg/ lần, 3 – 4 lần/ ngày hoặc tới 2 gam) có thể được dùng nếu có chỉ dẫn của thầy thuốc.

5. CHỐNG CHỈ ĐỊNH.

Mẫn cảm với Simeticone hoặc bất cứ thành phần nào của sản phẩm.

Trẻ em dưới 12 tuổi.

6. CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC.

- Không dùng Simeticone Normon 40 mg chewable tablets để điều trị cơn đau bụng ở trẻ em vì chưa có đủ thông tin về lợi ích và độ an toàn cho lứa tuổi này.
- Không dùng quá liều khuyến cáo.
- Tránh đồ uống có carbonat (soda hoặc nước ngọt) hoặc các thức ăn có thể làm tăng lượng khí trong dạ dày.
- Cần sự tư vấn từ nhân viên y tế nếu triệu chứng xấu đi hoặc vẫn tồn tại sau 14 ngày.
- Vì thuốc có chứa sorbitol nên bệnh nhân có sự di truyền hiếm gặp trong dung nạp fructose không nên dùng.
- Để xa tầm tay trẻ em.

7. SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ.

Phụ nữ có thai: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ có thai, chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt trội so với nguy cơ.

Phụ nữ cho con bú: Chưa có dữ liệu về sự bài tiết Simeticone vào sữa mẹ.

8. ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC.

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

9. TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ CỦA THUỐC.

- Mặc dù chưa có nghiên cứu nào được đưa ra, nhưng không nên dùng đồng thời Simeticone và thuốc nhuận tràng có nguồn gốc từ dầu khoáng (parafin) vì sẽ làm giảm tác dụng của thuốc.
- Levothyroxin: Dùng đồng thời Levothyroxin và Simeticone có thể làm giảm hấp thu Levothyroxin, dẫn đến làm giảm hiệu quả của Levothyroxin, gây giảm năng tuyến giáp. Nếu dùng đồng thời hai thuốc này phải uống cách nhau ít nhất 4 giờ. Theo dõi mức TSH và/hoặc các đánh giá khác về chức năng tuyến giáp khi bắt đầu dùng hoặc khi ngừng dùng Simeticone trong khi điều trị bằng Levothyroxin.

10. TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC.

Tác dụng không mong muốn nhẹ: buồn nôn và táo bón. Hiếm khi xảy ra các phản ứng quá mẫn như phát ban, ngứa, phù mắt, phù lưỡi, khó thở.

11. QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ.

Trong trường hợp dùng quá liều, cần điều trị triệu chứng xuất hiện. Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

12. ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC.

Nhóm thuốc: Thuốc chống đầy hơi

Mã ATC: A03AX13

Simeticone là chất có tính trơ, vì vậy đó không phải là chất có hoạt tính dược lý. Simeticone chỉ làm thay đổi sức căng bề mặt của các bong bóng khí, khiến chúng kết tụ lại.

13. ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC.

Simeticone không được hấp thu qua đường tiêu hóa.

14. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI.

Hộp 01 lọ HDPE × 30 viên nén nhai.

15. ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN, HẠN DÙNG, TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CỦA THUỐC.

Bảo quản: Để ở nhiệt độ dưới 30°C, tránh ẩm và ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất, 10 tháng kể từ ngày mở nắp.

Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn nhà sản xuất.

16. TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT.

LABORATORIOS NORMON, S.A

Địa chỉ: Ronda de Valdecarrizo, 6, Tres Cantos 28760 (Madrid), Tây Ban Nha